



Creon[®] 25000 U

pancréatine
Gélule gastrorésistante

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CREON 25000 U, gélule gastrorésistante, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CREON 25000 U, gélule gastrorésistante ?
3. COMMENT PRENDRE CREON 25000 U, gélule gastrorésistante ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CREON 25000 U, gélule gastrorésistante ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE CREON 25000 U, gélule gastrorésistante, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ENZYMOTHERAPIE SUBSTITUTIVE

Traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine de l'adulte et de l'enfant au cours :

- de la mucoviscidose ;
- de la pancréatite chronique documentée (notamment par l'existence de calcifications pancréatiques), en présence d'une stéatorrhée > 6 g/24 h ;
- des résections pancréatiques céphaliques ou totales.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CREON 25000 U, gélule gastrorésistante ?

Faites attention avec CREON 25000 U, gélule gastrorésistante :

Mises en garde

Ce type de médicament est utilisé depuis de très nombreuses années.

Cependant, du fait de la présence de parvovirus porcin (non pathogène chez l'homme) dans les extraits de poudre de pancréas, un risque théorique de transmission de virus animaux ne peut pas être totalement exclu lors de la prise de ce médicament.

En pratique, aucun cas de transmission de maladie infectieuse n'a été rapporté.

Ce risque théorique apparaît donc très inférieur au bénéfice thérapeutique de ce médicament dans l'indication d'insuffisance pancréatique documentée notamment la mucoviscidose.

Précautions d'emploi

Utiliser ce médicament avec précaution en cas de :

- hypersensibilité aux extraits pancréatiques,
- antécédents d'occlusion ou de résection intestinale.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin, car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Ce médicament peut être prescrit au cours de l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT PRENDRE CREON 25000 U, gélule gastrorésistante ?

Posologie

La posologie usuelle est :

- adultes et enfants de plus de 10 ans : 3 à 4 gélules par jour
- enfants de 5 à 10 ans : 2 à 3 gélules par jour

La posologie « optimale » doit être recherchée et modulée au cours du temps, en fonction de l'importance des troubles, grâce à une surveillance médicales régulière. En aucun cas elle ne doit être supérieure à 4 gélules par jour chez l'enfant et 10 gélules par jour chez l'adulte.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les gélules doivent être avalées avec de l'eau.

Il est recommandé d'ouvrir les gélules si vous avez subi une chirurgie de l'estomac (gastrectomie).

Les granulés gastrorésistants ne doivent jamais être mâchés.

Il est important de boire beaucoup d'eau, notamment en période de chaleur.

Fréquence d'administration

CREON doit être administré en 2 ou 3 prises quotidiennes, au cours des repas.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CREON 25000 U, gélule gastrorésistante, est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

De très rares cas de nausées, vomissements, diarrhée, constipation, douleurs abdominales et de réactions allergiques cutanées ont été rapportés.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER CREON 25000 U, gélule gastrorésistante ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser CREON 25000 U, gélule gastrorésistante, après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C et à l'abri de l'humidité. Reboucher soigneusement le flacon après chaque utilisation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient CREON 25000 U, gélule gastrorésistante ?

La substance active est :

Pancréatine*	300 mg
Correspondant à	
Activité lipolytique	25 000 U Ph. Eur.
Activité amylolytique	18 000 U Ph. Eur.
Activité protéolytique	1 000 U Ph. Eur.

Pour une gélule gastrorésistante.

* obtenue à partir de poudre de pancréas d'origine porcine.

Les autres composants sont :

Phtalate d'hypermellose, macrogol 4000, alcool cétylique, citrate de triéthyle, diméthicone 1000.

Composition de l'enveloppe de la gélule : gélatine, oxydes de fer rouge, et jaune (E172), dioxyde de titane (E171).

Qu'est-ce que CREON 25000 U, gélule gastrorésistante et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gélule gastrorésistante. Flacon de 60 gélules.

Titulaire - Exploitant

Abbott Products SAS

42 rue Rouget de Lisle

F 92150 Suresnes

Tél : +33 (0)1 46 25 85 00

Fabricant

Abbott Laboratories GmbH

31535 Neustadt a. Rbge

Allemagne

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Septembre 2012.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).

Ceci est un médicament.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS

ان هذا دواء

- الدواء مستحضر، ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- تقيد حرفياً بوصفة الطبيب، وبكيفية الاستعمال التي أوصى بها.
- اتبع تعليمات الصيدلي.
- الطبيب والصيدلي خبيران بمنافع الدواء واضراره.
- لا توقف من تلقاء نفسك مدة العلاج الموصوفة لك.
- لا تعاد تجرع الدواء، ولا تزيد في الجرعات بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الدواء في متناول الأطفال