

CARTE DE SURVEILLANCE DU PATIENT

306001-05

Pradaxa®
dabigatran etexilate

- Gardez toujours cette carte sur vous
- Assurez-vous d'utiliser toujours la dernière version

08012018

Boehringer
Ingelheim

Cher Patient,

Votre médecin a initié un traitement par Pradaxa®. Pour assurer la sécurité d'utilisation de Pradaxa®, veuillez tenir compte des informations importantes qui sont jointes.

Cette carte de surveillance du patient contenant des informations importantes concernant votre traitement, gardez-la en permanence sur vous pour informer les professionnels de santé que vous prenez Pradaxa®.

Pradaxa®
dabigatran etexilate

1

Information pour les patients concernant Pradaxa®

Concernant votre traitement

- Pradaxa® liquéfie le sang, ce qui prévient la formation de dangereux caillots sanguins.
- Suivez les instructions de votre médecin pour prendre Pradaxa®. N'oubliez jamais de dose et n'arrêtez jamais de prendre Pradaxa® sans en parler à votre médecin.
- Informez votre médecin de tous les médicaments que vous prenez actuellement.
- Informez votre médecin que vous prenez Pradaxa® avant toute intervention chirurgicale ou toute autre intervention invasive.

2

- Pradaxa® peut être pris avec ou sans aliment. Les gélules doivent être avalées entières avec un verre d'eau. Ne pas écraser, ne pas mâcher et ne pas vider les granules contenues dans la gélule.

Quand consulter un médecin

- La prise de Pradaxa® peut augmenter le risque de saignement. Contactez immédiatement votre médecin si vous présentez l'un des signes et symptômes suivants évocateurs d'un saignement : gonflement, gêne, douleur ou mal de tête inhabituel, étourdissement, pâleur, faiblesse, ecchymose inhabituelle, saignements de nez, saignements des gencives, long saignement inhabituel après une

3

coupure, règles ou saignements vaginaux anormaux, sang dans les urines qui peuvent être roses ou brunes, selles rouges/noires, toux avec crachats de sang, vomissements de sang ou de matières ressemblant à des grains de café.

- Si vous tombez ou si vous vous blessez, en particulier si vous vous cognez la tête, consultez un médecin de toute urgence.
- N'arrêtez pas de prendre Pradaxa® sans en parler à votre médecin, si vous avez des remontées acides, des nausées, des vomissements, une gêne au niveau de l'estomac, un ballonnement ou une douleur dans la partie supérieure de l'estomac.

4

Information pour les professionnels de santé concernant Pradaxa®

- Pradaxa® est un anticoagulant oral (inhibiteur direct de la thrombine).
- Pradaxa® peut devoir être préalablement arrêté en cas d'intervention chirurgicale ou toute autre intervention invasive.
- En cas d'événement hémorragique majeur, Pradaxa® doit être arrêté immédiatement.
- Un agent de réversion spécifique (Praxbind®) est disponible (se reporter aux Résumés des Caractéristiques du Produit de Pradaxa® et de Praxbind®).

5

- Pradaxa® étant principalement éliminé par les reins, une diurèse suffisante doit être maintenue. Pradaxa® est dialysable.

Veillez compléter cette partie ou demander à votre médecin de le faire.

Information concernant le patient

6

(Nom du patient)

(Date de naissance)

(Indication de l'anticoagulation)

(Dose de Pradaxa®)

18-0601

7