

emoflon®

Pommade rectale – Notice d'utilisation



Veillez lire attentivement cette notice, car elle contient des informations importantes pour vous. Ce produit est un dispositif médical réservé à l'adulte. Pour une efficacité maximale, vous devez toujours utiliser ce dispositif médical en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Composition

Sucralfate, beurre de cacao, lanoline (origine végétale), vaseline blanche, cire d'abeille blanche, eau purifiée, caprylyl glycol, extrait de calendula, extrait de camomille, extrait de feuille d'hamamélis.

Présentation

emoflon® se présente sous forme de pommade rectale.

Chaque tube contient 25 g de pommade rectale.

Contenu de la boîte : un tube et un applicateur en plastique à visser sur le tube.

Qu'est-ce que **emoflon®**, pommade rectale et dans quels cas l'utiliser ?

emoflon®, pommade rectale est indiquée dans le traitement des symptômes liés à la maladie hémorroïdaire et à ses complications (par ex. eczéma, fissure anale). La pommade **emoflon®** recouvre et protège l'épiderme ; elle apaise la peau enflammée et les démangeaisons, favorisant ainsi la régénération cutanée. Elle diminue le dessèchement de la peau, contribuant ainsi à la cicatrisation des lésions, et réduit le risque de fissures et de blessures causées par la défécation.

Quand devez-vous éviter d'utiliser **emoflon®**, pommade rectale ?

Ne pas utiliser **emoflon®** si vous êtes allergique à la lanoline ou à tout autre ingrédient contenu dans ce produit. Ne pas utiliser en cas de saignements des hémorroïdes.

Grossesse et allaitement

emoflon®, pommade rectale n'est pas contre-indiquée durant la grossesse ou l'allaitement, mais il est recommandé de consulter votre médecin.

Interactions avec d'autres médicaments

Il n'existe aucune interaction connue de **emoflon®**, pommade rectale avec d'autres médicaments. Toutefois, il est recommandé d'informer votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser cette pommade rectale simultanément avec d'autres médicaments par voie rectale.

L'utilisation simultanée d'une pommade rectale et d'un préservatif peut réduire l'efficacité du préservatif.

Comment utiliser **emoflon®**, pommade rectale ?

Veillez à toujours utiliser **emoflon®** en suivant les instructions de cette notice.

En cas d'utilisation différente de celle préconisée dans la notice, les symptômes pourraient ne pas être suffisamment soulagés, ou une irritation pourrait survenir.

Lavez-vous les mains avant d'utiliser **emoflon®**, pommade rectale.

Appliquez la pommade autour de l'anus, éventuellement après la défécation ou un bain de siège, ou bien appliquez une petite quantité de pommade (de la taille d'un petit pois) dans le rectum à l'aide de l'applicateur.

Veillez à ce que l'applicateur soit correctement vissé sur le tube.



Avant utilisation, vérifiez que l'emballage, le tube et l'applicateur sont intacts. Ne pas utiliser si l'emballage ou l'applicateur est endommagé.

Nettoyez l'applicateur à l'eau chaude et au savon et refermez le tube à l'aide du bouchon de protection après usage. Lavez-vous toujours les mains après avoir utilisé la pommade. Il est recommandé d'utiliser la pommade rectale une à deux fois par jour. L'applicateur ne peut être utilisé que par une seule personne.

emoflon®, pommade rectale ne doit pas être appliquée dans les yeux ou autour des yeux, ni dans la bouche ou sur les muqueuses de la bouche.

Si le produit entre en contact avec ces zones, essayez ou rincez-les.

La pommade pouvant salir les sous-vêtements, l'utilisation de protections hygiéniques est recommandée.

La durée du traitement dépend de l'amélioration des symptômes, mais cette pommade peut être utilisée jusqu'à 4 semaines sans interruption.

Consultez un médecin si vos symptômes ne s'améliorent pas après 1 à 2 semaines.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

L'utilisation de tout traitement local, notamment à long terme, peut entraîner des réactions d'hypersensibilité, dont les symptômes peuvent être une sensation de brûlure, des démangeaisons, des douleurs ou un érythème. Si vous ressentez de tels symptômes, cessez le traitement et consultez un médecin.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Mises en garde


Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. Ne pas avaler.

emoflon®, pommade rectale ne doit pas être utilisée dans le vagin.

Comment conserver **emoflon**®, pommade rectale ?

La date de péremption est indiquée sur la boîte et sur le tube. La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur le tube, au niveau de la soudure.

Ne pas utiliser après la date de péremption. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.



Conservé **emoflon**®, pommade rectale à une température ne dépassant pas 25°C et à l'abri de la lumière du soleil.

Ne jetez aucun dispositif médical au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment éliminer les dispositifs médicaux que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : mars 2017

Fabricant :

Egis Pharmaceuticals PLC, Keresztúri út 30–38., Budapest, 1106, Hongrie

Distributeur :



Les Laboratoires Servier, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex

Tél : + 33 (0)1 55 72 60 00

Explication des symboles sur l'emballage

	Attention ! Veuillez lire la notice avant utilisation
	Consulter la notice
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Limite de température
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil
	Fabricant
	Numéro de lot
	Date de péremption

CE2409
Dispositif médical