

**NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR****STEROGL 15 "H"  
600 000 UI/1,5 ml,  
solution injectable  
IM en ampoule****Ergocalciférol****Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Dans cette notice:**

1. QU'EST-CE QUE STEROGL 15 "H" 600 000 UI/1,5 ml, solution injectable IM en ampoule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?
  2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER STEROGL 15 "H" 600 000 UI/1,5 ml, solution injectable IM en ampoule?
  3. COMMENT UTILISER STEROGL 15 "H" 600 000 UI/1,5 ml, solution injectable IM en ampoule?
  4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?
  5. COMMENT CONSERVER STEROGL 15 "H" 600 000 UI/1,5 ml, solution injectable IM en ampoule?
  6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
- 1. QU'EST-CE QUE STEROGL 15 "H" 600 000 UI/1,5 ml, solution injectable IM en ampoule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?**

**Classe pharmacothérapeutique**  
VITAMINE D (A: appareil digestif et métabolisme)  
Ce médicament contient de la vitamine D qui permet la fixation osseuse du calcium.  
Cod. 352050 Ver.1

Il est indiqué dans le traitement et la prévention des carences en vitamine D chez l'adulte.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER STEROGL 15 "H" 600 000 UI/1,5 ml, solution injectable IM en ampoule?**

**N'utilisez jamais STEROGL 15 "H" 600 000 UI/1,5 ml, solution injectable IM en ampoule dans les cas suivants:**

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'arachide ou au soja, en raison de la présence d'huile d'arachide,
- antécédent d'allergie à l'un des constituants,
- hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang),
- hypercalciurie (taux anormalement élevé de calcium dans les urines),
- lithiase calcique (calcul rénal).

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

**Faites attention avec STEROGL 15 "H" 600 000 UI/1,5 ml, solution injectable IM en ampoule:**

**Mises en garde spéciales**  
Afin d'éviter un surdosage en vitamine D, respecter la posologie et prévenir votre médecin en cas d'association avec un traitement contenant déjà cette vitamine.

En cas d'administration de fortes doses et répétées de vitamine D, ou en cas d'association avec des fortes doses de calcium, il est nécessaire de surveiller le taux de calcium dans le sang et les urines.

Ce médicament contient de l'huile d'arachide et peut provoquer des réactions allergiques sévères.

**Précautions d'emploi**  
*EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

**Prise ou utilisation d'autres médicaments:**  
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

**Grossesse et allaitement**  
Du fait de la forte teneur en vitamine D, il est

préférable de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement.  
D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.

Liste des excipients à effet notoire:  
Huile d'arachide

**3. COMMENT UTILISER STEROGL 15 "H" 600 000 UI/1,5 ml, solution injectable IM en ampoule?****Posologie**

RÉSERVE A L'ADULTE.

Ce dosage n'est pas adapté à l'enfant.

La posologie usuelle est de ½ à 1 ampoule, en une prise, une fois par an.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE:

- IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE

**Mode et voie d'administration**

Voie Intra-Musculaire.

L'ampoule peut être également administrée par voie orale.

**Durée du traitement**

**Ne pas renouveler la prise.**

**Si vous avez utilisé plus de STEROGL 15 "H" 600 000 UI/1,5 ml, solution injectable IM en ampoule que vous n'auriez dû:**

L'apparition de maux de tête, fatigue, perte d'appétit, amaigrissement, arrêt de croissance, nausées, vomissements, émission d'une quantité excessive d'urine, soif intense, hypertension artérielle, sont des signes d'une dose excessive en vitamine D notamment en cas d'ingestion accidentelle du flacon chez le nourrisson ou l'enfant. AVERTIR IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIDERABLES EVENTUELS?**

Comme tous les médicaments, STEROGL 15 "H" 600 000 UI/1,5 ml, solution injectable IM en ampoule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- affections de la peau et du tissu sous-cutané: prurit, éruption cutanée, érythème, œdème.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si

certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

**5. COMMENT CONSERVER STEROGL 15 "H" 600 000 UI/1,5 ml, solution injectable IM en ampoule?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser STEROGL 15 "H" 600 000 UI/1,5 ml, solution injectable IM en ampoule après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de la lumière.

Après ouverture: le produit doit être utilisé immédiatement.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

**6. INFORMATION SUPPLEMENTAIRES**

**Que contient STEROGL 15 "H" 600 000 UI/1,5 ml, solution injectable IM en ampoule?**

**La substance active est:**

Ergocalciférol .....600 000 UI  
Pour 1 ampoule de 1,5 ml

**Les autres composants sont:** Huile d'arachide.

**Qu'est-ce que STEROGL 15 "H" 600 000 UI/1,5 ml, solution injectable IM en ampoule et contenu de l'emballage extérieur?**

Ce médicament se présente sous forme de solution injectable en ampoule de 1,5 ml, boîte de 1 ampoule.

**Titulaire:** DESMA PHARMA S.A.R.L.

25, RUE LA BOETIE  
75008 PARIS

**Exploitant:** LABORATOIRE DB PHARMA

1 BIS, RUE DU COMMANDANT RIVIERE  
94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE

**Fabricant:** ABIOPEN PHARMA S.P.A.

VIA MEUCCI, 36  
56014 OSPEDALETTO (PI) - ITALIE

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Juin 2011.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Assaps (France).